



# Locamin

500 mg/ml, picături orale, soluție,  
Metamizol sodic



## Indicații

durere severă acută, post-traumatică sau post-operatorie

febră mare, care nu răspunde la alte mijloace terapeutice

colici dureroase

dureri de origine tumorală

alte dureri severe, acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice sunt contraindicate

## Doze și mod de administrare:

Dozele unice recomandate și dozele maxime zilnice, în funcție de greutate sau vârstă:

Este esențial să se aleagă cea mai mică doză care controlează durerea și febra.

Greutate corporală/vârstă		Doză unică		Doza zilnică maximă	
kg	vârsta	picături	mg	picături	mg
<9	<12 luni	1-5	25-125	4-20	100-500
9-15	1-3 ani	3-10	75-250	12-40	300-1000
16-23	4-6 ani	5-15	125-375	20-60	500-1500
24-30	7-9 ani	8-20	200-500	32-80	800-2000
31-45	10-12 ani	10-30	250-750	40-120	1000-3000
46-53	13-14 ani	15-35	375-875	60-140	1500-3500
>53	≥ 15 ani	20-40	500-1000	80-160	2000-4000

- În caz de febră, o doză de 10 mg metamizol/kg corp este în general suficientă la copii.
- La adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani (>53 kg), se poate administra o doză de până la 1000 mg metamizol, sub forma unei doze unice.
- În conformitate cu doza zilnică maximă, o doză unică poate fi administrată până la de 4 ori pe zi, la intervale de 6-8 ore.

## Locamin intervine acolo unde febra și durerea nu răspund la alte mijloace terapeutice.

