

6 ani +



### Fiecare comprimat de supt conține:

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Clorură de benzoxoniu   | 1 mg |
| Clorhidrat de lidocaină | 1 mg |

Data reînnoirii autorizației: Mai 2015

### Administrare

**Vârsta 6-11 ani:** 1 comprimat la interval de 2-3 ore fără a se depăși 6 comprimate pe zi

**12+ ani:** 1 comprimat la interval de 2-3 ore. În cazul infecțiilor severe 1 comprimat la fiecare 1-2 ore fără a se depăși 10 comprimate pe zi

Comprimatul de supt nu trebuie mestecat sau înghițit

### DURERE ÎN GÂT



Miros și gust de portocale, cu o ușoară senzație anestezică

### Acțiune sinergică

**Benzoxoniu** (antiviral, antibacterian, antifungic)



**Lidocaină** (anestezic local)

### Indicații OROFAR:

**Tratamentul simptomatic al infecțiilor orofaringiene:**  
dureri în gât asociate cu răceli, faringite sau laringite, stomatite, afte, gingivite.  
**Ameliorează durerile de la nivelul gurii și gâtului. Adjuvant în amigdalite.**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.  
Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

STADA M&D SRL, Str. Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, et. 1, sect. 5, București, România  
[www.stada.ro](http://www.stada.ro)



4 ani +

## Fiecare 1 ml de soluție conține:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Clorură de benzoxoniu   | 2 mg   |
| Clorhidrat de lidocaină | 1,5 mg |

Data reînnoirii autorizației: Ianuarie 2017



**Spray bucofaringian, soluție limpede, incoloră, cu gust și miros de balsam.**

## Administrare

Vârstă 4-11 ani: 2-3 pulverizări

12+ ani: 2-4 pulverizări

Pulverizari în gură sau în partea posterioară a gurii, pe zona afectată

Doza poate fi repetată de 3 până la 6 ori pe zi, după cum este necesar, la un interval de cel puțin 2-3 ore

DURERE ÎN GÂT

## Acțiune sinergică

**Benzoxoniu** (antiviral, antibacterian, antifungic) **+** **Lidocaină** (anestezic local)

## Indicații OROFAR:

**Tratamentul simptomatic al infecțiilor orofaringiene:**  
dureri în gât asociate cu răceli, faringite sau laringite, stomatite, afte, gingivite.  
**Ameliorează durerile de la nivelul gurii și gâtului. Adjuvant în amigdalite.**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.  
Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

STADA M&D SRL, Str. Sfântul Elefterie, nr. 18, Parte A, et. 1, sect. 5, București, România  
[www.stada.ro](http://www.stada.ro)

