

Degasil®

**Simeticonă 280 mg:
Confort Intestinal Avansat**



CONTEXTUL CLINIC

Meteorismul intestinal afectează recuperarea postoperatorie, starea în sarcină și precizia diagnosticului imagistic.



Recuperare postoperatorie

Gaze acumulate și pareza intestinală tranzitorie pot prelungi recuperarea după intervenții ginecologice. (ref. 1)



Sarcină și alăptare

Modificările hormonale și compresia uterină reduc motilitatea, provocând balonare frecventă. (ref. 2)



Examinări diagnostice

Excesul de gaze generează artefacte ce compromit claritatea ecografiilor pelviene și abdominale. (ref. 3)

INCIDENȚA DISCONFORTULUI GASTROINTESTINAL (STATISTICI)

60%

Postoperator
(ref. 4)

Disconfort abdominal gazos comun după intervenții ginecologice.

80%

Sarcină
(ref. 2)

Majoritatea femeilor raportează flatulență frecventă în sarcină.

45%

Diagnostic compromis
(ref. 3)

Gazele intestinale limitează vizibilitatea ecografică pelviană.

MECANISM DE ACȚIUNE SIMETICONĂ



Acțiune locală

Reduce tensiunea superficială a gazelor, facilitând eliminarea naturală. (ref. 5)



Non-absorbabilă

Nu intră în circulația sistemică. (ref. 5)



Non-metabolizabilă

Eliminată intact, fără interacțiuni. (ref. 5)



Debut rapid

Efect observat în câteva minute. (ref. 5)

**280 mg
într-o capsulă**

De ce contează concentrația de 280 mg?

Doza completă pentru ameliorarea tulburărilor GI dintr-o singură capsulă: complianță crescută, risc minim de omitere, comoditate maximă.

AVANTAJUL CONCENTRAȚIEI DE 280 MG SIMETICONĂ

Analiza comparativă a dozelor de simeticonă

Degasil 280mg are eficiență superioară printr-o singură capsulă, reducând semnificativ sarcina de administrare.

Produs	Doza/Capsulă	Capsule/Doză	Capsule/Zi (Recomandare)
Degasil 280 mg	280 mg	1	3
Simeticonă 80mg	80 mg	3-4	9-12
Simeticonă 40mg	40 mg	7	21

O singură capsulă Degasil 280mg înlocuiește până la 7 capsule Simeticonă 40 mg, îmbunătățind complianța terapeutică.

INDICAȚII ȘI SIGURANȚĂ SIMETICONĂ



Sarcină și alăptare

Utilizabil în toate trimestrele datorită absenței absorbției sistemice.



Balonare și flatulență

Ameliorarea disconfortului, atât post prandial cât și pre/post operator.



Compatibil diabet

Fără zaharuri sau excipienți cu impact glicemic.



Pregătire pentru investigații

Eliminarea gazelor ce pot interfera și modifica rezultatul investigațiilor

Posologie Degasil 280 mg

1 capsulă după fiecare masă

Administrare postprandială pentru eficacitate.

Recomandat 3 capsule zilnic

Doza zilnică recomandată de până la 840mg.

Durată maximă 30 zile

Reevaluare necesară la persistența simptomelor.



Degasil® Confort intestinal avansat în decompresia abdominală

280 mg simeticonă într-o singură capsulă moale:
doză unică, siguranță ideală în sarcină/alăptare/diabet,
versatilitate clinică în terapie și diagnostic imagistic.

Referințe

1. Z-L, et al. Int J Colorectal Dis. 2020;35:2105-2112. 2. Wiechers C, et al. npj Digital Medicine. 2023;6:183. 3. Wilson SR, et al. Radiology. 1999;210(1):113-123. 4. Hou Z, et al. PLoS One. 2024;19(8):e0308175. 5. Ingold CJ, Akhondi H. Simethicone. StatPearls. 2025. 6. NICHD. Simethicone. LactMed. 2006-. 7. Shahbandari Jourshari M, et al. J Educ Health Promot. 2024;13:251. 8. Cao RR, et al. J Dig Dis. 2022.

Degasil® Simeticonă 280 mg — Dispozitiv medical clasa IIa