

STADA

OROFAR[®]

**ACȚIUNE EFICIENTĂ ȘI
RAPIDĂ ÎMPOTRIVA
DURERII ÎN GÂT**



**OROFAR pentru
ameliorarea rapidă a
durerii și protecție
antiseptică în cazuri
ușoare și moderate.**



**OROFAR INTENSIV
pentru efect
antiinflamator puternic și
durată de până la 6 ore
de acțiune în cazuri
moderat-severe, cu
inflamație pronunțată.**





Comprimat
24 comprimate de supt



Spray
30 ml spray

Compoziție:

- Orofar 1 mg/1 mg comprimate x 24: fiecare comprimat de supt conține clorură de benzoxoniu 1 mg, clorhidrat de lidocaină 1 mg.
- Orofar 2 mg + 1,5 mg/ml spray 30 ml: fiecare 1 ml soluție conține clorură de benzoxoniu 2 mg, clorhidrat de lidocaină 1,5 mg.

Acțiune:

Asocierea benzoxoniului (antiviral, antibacterian, fungicid) + lidocainei (anestezic local) creează un efect terapeutic sinergic, abordând simultan componenta infecțioasă și componenta dureroasă a faringitei acute.

- reducerea încărcăturii bacteriene;
- analgezie rapidă;
- facilitarea vindecării*;
- complianță crescută a pacientului.

Criteriu	OROFAR (benzoxoniu + lidocaina)
Componenta inflamatorie	modestă (antiseptic, reduce inflamația secundară) *
Componenta infecțioasă	acțiune antiseptică directă
Vârsta minimă	> 4 ani pentru spray și > 6 ani pentru comprimate de supt
Durată tratament	max 5 zile
Contraindicații	alergie la anestezice locale / amoniu cuaternar / substanțe active sau excipienți
Avantaje	• efect antiseptic local; • onset imediat; • formulare pentru adulți și pentru copii, în ambele forme farmaceutice.
Situații ideale	• faringită; • risc de infecție secundară; • durere acută la nivelul gurii și gâtului.

*Jin SG, Yousaf AM, Jang SW, Son MW, Kim KS, Kim DW, Li DX, Kim JO, Yong CS, Choi HG. In vivo wound-healing effects of novel benzalkonium chloride-loaded hydrocolloid wound dressing. Drug Dev Res. 2015 May;76(3):157-65. doi: 10.1002/ddr.21253. Epub 2015 May 8. PMID: 25959289/ Rongo C, Prusty B, Baban B, Daoud U, Ilyas MS, Kimmerling K. Antimicrobial quaternary ammonium silane K21 promotes wound healing. J Wound Care. 2024 Mar 1;33(Sup3):S11-S12. doi: 10.12968/jowc.2024.33.Sup3.S11a. PMID: 38457304; PMCID: PMC11217925.



Pastile
16 pastile




Spray
15 ml

Compoziție:

- Orofar Intensiv 8,75 mg x 16: fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.
- Orofar Intensiv 8,75 mg/doză spray 15 ml: o doză (3 pulverizări) conține flurbiprofen 8,75 mg; o pulverizare conține flurbiprofen 2,92 mg; 1 ml de spray bucofaringian, soluție, conține flurbiprofen 16,2 mg.

Acțiune:

Antiinflamator prin inhibarea sintezei prostaglandinelor, mediatori-cheie ai inflamației orofaringiene.



Criteriu	OROFAR INTENSIV (flurbiprofen)
Componenta inflamatorie	puternică (inhibare directă a prostaglandinelor)
Componenta infecțioasă	fără acțiune antimicrobiană directă
Vârsta minimă	> 12 ani pentru pastile și 18 ani pentru spray
Durată tratament	max 3 zile
Contraindicații	alergie AINS-uri, astm indus AINS; substanța activă sau excipienți, ulcer gastro-duodenal activ sau în antecedente; ultimul trimestru de sarcină; insuficiență cardiacă severă, insuficiență renală severă sau insuficiență hepatică severă; antecedente de hemoragie, colită severă, tulburări hematopoietice
Avantaje	• antiinflamator puternic; • durată de acțiune de până la 6 ore; • formulare pentru adulți (spray) și pentru adulți și copii (pastile).
Situații ideale**	• faringită severă; • edem faringian; • faringită streptococică.

**Radkova E, Burova N, Bychkova V, DeVito R. Efficacy of flurbiprofen 8.75 mg delivered as a spray or lozenge in patients with sore throat due to upper respiratory tract infection: a randomized, non-inferiority trial in the Russian Federation. J Pain Res. 2017 Jul 6;10:1591-1600. doi: 10.2147/JPR.S135602. PMID: 28740426; PMCID: PMC5505534./ Schachtel B, Shephard A, Schachtel A, Shea T, Smith A, Tselenti E. Evidence of the Efficacy of Flurbiprofen 8.75 mg Lozenges for Patients Receiving Antibiotics for Laboratory-Confirmed Streptococcal Pharyngitis. Ear Nose Throat J. 2023 Dec;102(12):NP609-NP617. doi: 10.1177/01455613211025754. Epub 2021 Jul 14. PMID: 34261371./ de Looze F, Shephard A, Smith AB. Locally Delivered Flurbiprofen 8.75 mg for Treatment and Prevention of Sore Throat: A Narrative Review of Clinical Studies. J Pain Res. 2019 Dec 27;12:3477-3509. doi: 10.2147/JPR.S221706. PMID: 31920372; PMCID: PMC6938200

Mod de administrare:

Orofar 1mg/1mg comprimate x 24	Copii 6–11 ani: 1 comprimat la interval de 2–3 ore, fără a depăși 6 comprimate pe zi. Adulți și copii ≥12 ani: 1 comprimat la interval de 2–3 ore. În cazul infecțiilor severe, 1 comprimat la fiecare 1–2 ore, fără a depăși 10 comprimate pe zi. În cazul afteilor bucale, comprimatul se lasă să se dizolve lent în contact cu leziunea. Comprimatele de supt nu trebuie mestecate sau înghițite. Nu trebuie administrate în timpul sau înainte de a bea sau a mânca.
Orofar 2mg+1,5mg/ml spray 30ml	Copii 4–11 ani: 2–3 pulverizări pe zona afectată. Adulți și copii ≥12 ani: 2–4 pulverizări pe zona afectată. Doza poate fi repetată de 3–6 ori pe zi, la interval de cel puțin 2–3 ore. Nu trebuie administrat în timpul sau înainte de a bea sau a mânca.
Orofar Intensiv 8,75mg/doza spray 15ml	Adulți și adolescenți ≥18 ani: 1 doză (= 3 pulverizări) în zona afectată, administrată la interval de 3–6 ore, până la maximum 5 doze în 24 de ore, timp de maximum 3 zile. Administrarea concomitentă cu alimente poate întârzia debutul eficacității.
Orofar Intensiv 8,75mg pastile x 16	Adulți și copii ≥12 ani: 1 pastilă la interval de 3–6 ore, maximum 5 pastile în 24 de ore, timp de maximum 3 zile. Pastila se dizolvă lent și trebuie deplasată în interiorul cavității bucale pentru a evita iritarea locală. Administrarea concomitentă cu alimente poate întârzia debutul eficacității.

Algoritm de selecție terapeutică

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

STADA M&D SRL, Str. Sfântul Elefterie, nr. 18, Parter A, et. 1, sect. 5, București, România
www.stada.ro



Referințe:

- RCP Orofar 1 mg/1 mg comprimate de supt; RCP Orofar 2 mg + 1,5 mg/ml spray bucofaringian, soluție; RCP Orofar Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile; RCP Orofar Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție
- Zee Lab Pharmacy. Benefits of Benzoxonium Chloride + Lidocaine. 2015
- Foadi N, et al. A combination of topical antiseptics for the treatment of sore throat. Eur J Anaesthesiol. 2014;31:88
- https://www.researchgate.net/publication/342078921_The_effectiveness_of_combination_of_benzoxonium_chloride_lidocaine_hydrochloride_for_treating_the_gingivitis_and_ulceration_in_human
- Lambkin-Williams R, et al. Inhibition of viral and bacterial trigger-stimulated prostaglandin E2 by flurbiprofen. J Laryngol Otol. 2020; 134(9):844-850
- Looze F, et al. Locally Delivered Flurbiprofen 8.75 mg for Treatment and Prevention of Sore Throat. Drugs. 2019;79(18):1945-1963
- Jiang X., Renkema H., Pennings B, et al. Mechanism of action and potential applications of selective inhibition of microsomal prostaglandin E synthase-1-mediated PGE2 biosynthesis by sonliceromanol's metabolite KH176m. Sci Rep 11, 880 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-79466-w>
- OROFAR 1 mg/1 mg comprimate de supt - Data ultimei reinnoiri a autorizației: Mai 2015
- OROFAR 2 mg + 1,5 mg/ml spray bucofaringian, soluție - Data ultimei reinnoiri a autorizației: Ianuarie 2017
- Orofar Intensiv Portocale fără zahăr 8,75 mg pastile - Data primei autorizări: Noiembrie 2023
- Orofar Intensiv 8,75 mg/doză spray bucofaringian, soluție - Data primei autorizări: Ianuarie 2024
- Cod intern: RO-ORF/DA-V1/ iunie 2026.

STADA